

## Speiseröhre (C15) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1991-2018)

Diagnose- periode <sup>1)</sup>	Risikopopulation <sup>2)</sup>	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
<b>Insgesamt</b>					
1991-1995	1.024	33,2	13,5	10,2	7,2
1996-2000	1.393	38,2	16,5	12,9	9,4
2001-2005	1.674	44,5	22,3	16,2	12,2
2006-2010	1.871	47,1	23,7	18,6	14,1
2011-2015	2.001	50,0	26,5	21,0	-
2016-2018	1.222	49,8	28,3	-	-
<b>Männer</b>					
1991-1995	847	33,1	12,8	9,7	6,3
1996-2000	1.140	39,3	16,7	12,9	8,8
2001-2005	1.352	46,0	22,6	16,2	12,0
2006-2010	1.498	46,8	22,7	17,5	13,2
2011-2015	1.593	50,3	26,0	20,9	-
2016-2018	974	51,5	28,3	-	-
<b>Frauen</b>					
1991-1995	177	33,7	17,0	12,7	11,9
1996-2000	253	33,1	15,9	13,0	12,3
2001-2005	322	37,9	21,0	16,5	13,2
2006-2010	373	48,3	27,7	23,0	17,6
2011-2015	408	48,9	28,6	21,7	-
2016-2018	248	43,2	27,9	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020). Erstellt am 21.12.2020. 1) Ende des Follow-up 31.12.2019. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.