

Bauchspeicheldrüse (C25) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1991-2018)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1991-1995	3.987	17,4	7,4	6,1	5,6
1996-2000	4.925	21,1	6,8	4,7	3,4
2001-2005	5.594	25,2	8,5	6,2	4,7
2006-2010	6.418	30,5	11,1	7,4	5,3
2011-2015	7.488	35,9	14,3	10,4	-
2016-2018	4.805	39,0	16,5	-	-
Männer					
1991-1995	1.834	17,5	7,2	5,4	4,9
1996-2000	2.296	22,1	7,5	5,0	3,6
2001-2005	2.630	25,3	8,5	6,2	4,8
2006-2010	3.161	31,1	10,6	6,9	5,1
2011-2015	3.741	36,1	14,5	10,4	-
2016-2018	2.483	40,3	16,5	-	-
Frauen					
1991-1995	2.153	17,2	7,6	6,7	6,2
1996-2000	2.629	20,2	6,2	4,5	3,2
2001-2005	2.964	25,1	8,4	6,2	4,7
2006-2010	3.257	29,9	11,5	7,8	5,5
2011-2015	3.747	35,8	14,2	10,4	-
2016-2018	2.322	37,6	16,4	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020). Erstellt am 21.12.2020. 1) Ende des Follow-up 31.12.2019. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.