

Non-Hodgkin (C82-C86,C96) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1991-2018)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1991-1995	3.520	70,7	58,4	52,8	44,4
1996-2000	4.820	74,4	61,4	54,9	46,4
2001-2005	5.401	76,8	67,4	62,7	56,1
2006-2010	5.997	78,3	69,5	66,1	59,3
2011-2015	6.407	79,0	71,4	67,4	-
2016-2018	3.881	79,6	71,3	-	-
Männer					
1991-1995	1.728	70,4	58,3	53,1	43,8
1996-2000	2.385	75,7	62,4	55,0	45,8
2001-2005	2.785	76,9	66,9	62,7	57,6
2006-2010	3.140	79,3	69,7	66,3	59,1
2011-2015	3.454	78,7	71,4	67,2	-
2016-2018	2.105	78,2	69,4	-	-
Frauen					
1991-1995	1.792	70,9	58,6	52,5	45,0
1996-2000	2.435	73,2	60,4	54,8	47,1
2001-2005	2.616	76,6	67,9	62,8	54,6
2006-2010	2.857	77,1	69,3	65,9	59,5
2011-2015	2.953	79,3	71,3	67,5	-
2016-2018	1.776	81,3	73,5	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020). Erstellt am 21.12.2020. 1) Ende des Follow-up 31.12.2019. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.