

Kehlkopf (C32) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1991-2018)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1991-1995	1.486	80,2	63,5	56,6	46,1
1996-2000	1.585	82,6	64,3	57,0	44,8
2001-2005	1.543	83,3	66,7	60,6	46,0
2006-2010	1.493	85,2	69,3	59,7	46,9
2011-2015	1.493	84,2	68,7	60,6	-
2016-2018	930	84,5	67,1	-	-
Männer					
1991-1995	1.330	80,1	63,3	56,2	45,2
1996-2000	1.414	83,1	64,4	56,9	44,8
2001-2005	1.363	83,3	66,5	60,6	45,7
2006-2010	1.303	85,0	68,1	58,9	46,2
2011-2015	1.308	84,1	67,8	59,8	-
2016-2018	790	84,2	66,8	-	-
Frauen					
1991-1995	156	80,7	65,3	60,2	52,9
1996-2000	171	79,1	63,5	57,9	45,4
2001-2005	180	83,3	68,4	61,0	48,5
2006-2010	190	85,9	77,5	64,9	51,7
2011-2015	185	84,3	75,1	66,5	-
2016-2018	140	85,8	68,4	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020). Erstellt am 21.12.2020. 1) Ende des Follow-up 31.12.2019. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.